

NOTE XXXI.

DESCRIPTIONS DE COLÉOPTÈRES NOUVEAUX DE LA
FAMILLE DES EUMOLPIDES

PAR

M. Ed. LEFÈVRE,

Ancien Président de la Société Entomologique de France.

Pagria aeneicollis, spec. nov.

Breviter ovata, convexa, subitus brunneo-picea, capite prothoraceque nigris, viridi-reflexo-ænescentibus, nitidis, labro, palpis, antennis pedibusque fulvis, elytris fulvis (sutura tota lata nigro-picea, vage reflexo-ænea), singulo maculis duabus (altera intra impressionem basalem, postice magis minusve extensa, altera lata juxta marginem lateralem posita) nigro-piceis.

Long. $1\frac{1}{2}$ mill.; lat. 1 mill.

Var. β . *Elytrorum maculis omnino deletis.*

Java: Batavia (de Gavere et A. L. v. Hasselt); Sumatra: Lahat (Giesbers), Fort de Kock (v. Riemsdijk).

Caput inter oculos vage transversim impressum, remote undique leviter punctatum, post oculos late et profunde canaliculatum. Prothorax in medio disci remote et leviter, ad latera autem grosse et subconfluenter, punctatus, juxta basin spatio lato lævi instructus, margine laterali utrinque medio subacute angulatus. Scutellum parvum, piceum, læve, apice rotundatum. Elytra infra basin breviter transversim utrinque impressa (spatio inter callum humerale et scutellum subcalloso, lævi), lineatim regulariter punc-

tata, punctis grossis, nigris, intra impressionem basalem profundioribus. Pedes breves, femoribus subtus dente minutissimo armatis.

Voisin du *P. sumatrensis* Ed. Lef. En diffère surtout par la taille plus petite et la couleur noir-bronzé de la tête et du prothorax.

Heteraspis igneipennis, spec. nov.

Breviter oblonga, convexa, undique pilis albidis suberectis modice obtecta, corpore subtus, capite prothorace, scutello pedibusque metallico-viridibus, magis minusve cyaneo-tinctis, elytris cupreo-igneis, fulgidis, sutura sicut et margine laterali utrinque concinne viridi-metallicis vel cyaneis.

Long. 6— $6\frac{1}{2}$ mill.; lat. $3\frac{1}{2}$ — $3\frac{3}{4}$ mill.

Timor (Wienecke).

Caput sat dense punctatum, epistomate antice angulatim parum profunde emarginato, labro fusco, viridi-aeneo-tincto, palpis antennarumque articulis 2—5 saturate fulvis, harum articulo 1°. viridi-metallico, quinque ultimis nigris, modice ampliatis. Prothorax crebre et grosse punctatus, angulo anteriori spatio calloso utrinque notato. Elytra basi thorace latiora, leviter inordinatim punctata, punctis versus apicem minoribus, fere deletis.

Pseudocolaspis insignis, spec. nov.

Late ovata, convexa, viridi-aurata vel fusco-anea, subcupreo-reflexo-tincta, nitida, undique pilis longis argenteo-serviceis (appressis et rectis intermixtis) sat dense obtecta, labro sicut et palpis nigro-piceis, antennis, tibiis tarsisque brunneo-testaceis, femoribus crebre fortiter punctatis, subtus dente brevi armatis.

Long. $5\frac{1}{2}$ —7 mill.; lat. hum. $3\frac{1}{2}$ —4 mill.

Somalis. (Présenté par M. van Lansberge).

Caput creberrime confluenter rugose punctatum, epistomate antice arcuatim emarginato. Prothorax convexus, plus

duplo latior quam longior, crebre sed parum profunde substrigatim punctatus, infra marginem anticum transversim evidenter impressus, margine laterali utrinque antice deleto. Scutellum latum, pentagonum, punctatum. Elytra basi thorace latiora, infra basin leviter subarcuatim impressa, spatio inter callum humerale et scutellum subtumido, dense minute punctata, interstitiis basi et intra impressionem basalem leviter substrigatis, callo humerali ipso elevato, lœvi, tumido.

Pseudocolaspis Lansbergi, spec. nov.

Ovata, postice attenuata, convexa, metallico-ænea, subcupreo-tincta, nitidissima, undique pilis squamæformibus appressis (corpoce subtus albido, supra autem aureo) dense obtecta, labro æneo-cupreo, fulgido, palpis sicut et antennis nigro-cyaneis, harum articulis 5 ultimis dilutioribus, minus nitidis, pedibus gracilibus, æneo-cupreis, femoribus tibiisque elongatis, illis crebre fortiter punctatis, subtus dente longo et acuto armatis.

Long. $3\frac{1}{2}$ —4 mill.; lat. hum. $2\frac{1}{3}$ — $2\frac{1}{2}$ mill.

Somalis. (Présenté par M. van Lansberge).

Caput subcrebre punctatum, in media fronte spatio lœvi longitudinaliter instructum, epistomate antice arcuatim emarginato. Prothorax convexus, vix duplo latior quam longior, crebre undique punctatus, margine laterali utrinque antice deleto. Scutellum latum, subpentagonum, punctatum. Elytra basi thorace latiora, postice attenuata, infra basin subarcuatim sat fortiter impressa, spatio inter callum humerale et scutellum subtumido, dense minute punctata, punctis intra impressionem basalem paulo majoribus, callo humerali ipso tumido, punctulato, lucido.

Abirus globicollis, spec. nov.

Breviter oblongus, subcylindricus, subtus viridi-æneus et pilis albido modice obtectus, supra viridi-auratus, subcupreo-

aeneo-micans, *nitidus*, *labro sicut et palpis piceis*, *antennis dimidio corpore vix longioribus*, *articulo 1º. metallico-viridi*, *2—6 brunneo-testaceis*, *quinque ultimis saturate cyaneis*, *fortiter ampliatis*, *pedibus saturate cyaneis*, *vage viridi-tinctis*.

Long. 9 mill.; lat. $4\frac{1}{2}$ mill.

Insula Banka (Vosmaer).

Caput pilis albidis appressis, certo situ tantum conspiciens, minutissime instructum, vertice lato, subremote irregulariter punctato, medio longitudinaliter obsolete sulcato, ad latera substrigoso. Prothorax valde convexus, subglobosus, crebre undique aciculatim punctatus. Elytra juxta suturam lineatim sat regulariter punctatis, interstitiis planis, versus apicem subelevatis, disco exteriori transversim elevato-strigata.

Phytorus assimilis, spec. nov.

Oblongo-subelongatus, *convexus*, *subtus nigro-piceus*, *supra fusco-aeneus*, *subcupreo-viridi-tinctus*, *nitidus*, *labro*, *palpis antennisque fulvo-testaceis*, *pedibus piceo-brunneis*.

Long. 6— $6\frac{1}{2}$ mill.; lat. $3\frac{1}{2}$ — $3\frac{3}{4}$ mill.

Borneo (Schwaner et Müller).

Caput inter oculos profunde transversim impressum, vertice subcrebre punctulato, margine antico bilobato et sulco brevi longitudinaliter instructo, epistomate remote punctulato, antice subrecte truncato. Prothorax sat deuse leviter punctatus, punctis juxta marginem lateralem utrinque fere deletis. Scutellum laeve. Elytra regulariter lineatim striata, striis vix perspicue punctulatis, interstitiis levibus, magis minusve convexis. Femora intermedia sicut et postica mutica, antica subtus denticulo minutissimo armata.

Cette espèce est voisine du *P. fervidus* Ed. Lef. Elle en diffère par la taille plus forte, la forme générale plus allongée et parallèle, par les intervalles des stries des élytres plus ou moins convexes.

Phytorus pallidus, spec. nov.

*Breviter suboblongo-ovatus, modice convexus, omnino late
flavus, nitidus, oculis sicut et mandibulis nigris.*

Long. $4\frac{1}{2}$ mill.; lat. $2\frac{1}{4}$ mill.

Borneo: Pleyhari (Semmelink).

Caput et prothorax lèves, illud inter oculos transversim sulcatum. Elytra regulariter sat profunde punctato-striata, punctis minutissimis, intersticiis convexiusculis. Femora antica sicut et postica subtus dente parvo acuto armata.

Stethotes fulvilabris, spec. nov.

*Ovata, convexa, postice attenuata, subtus nigra, supra
nigro-cyanea, nitida, labro, palpis antennisque fulvo-testaceis,
harum articulis quinque ultimis paululum infuscatis.*

Long. $3\frac{1}{2}$ mill.; lat. 2 mill.

Nouvelle Guinée: Andaï (v. Rosenberg).

Caput utrinque post oculum late sed parum profunde excavatum, vertice subtumido, strigose punctato, media fronte profunde fossulata. Prothorax subconicus, dorso subtiliter, ad latera fortius, subremote punctatus. Elytra basi thorace multo latiora, postice attenuata, regulariter lineatim punctata, punctis infra humeros et ad latera majoribus. Pedes cyaneo-nigri, femoribus subtus dente longo et acuto armatis.

Stethotes longimana, spec. nov.

*Ovata, convexa, postice attenuata, subtus rufo-brunnea,
viridi-æneo-tincta, supra nigra, vase viridi-cyaneo-tincta,
nitida, antennarum articulis quatuor primis rufo-fulvis,
reliquis piceis, pedibus anticis valde elongatis, rufo-brunneis,
cyaneo-reflexo-tinetis.*

Long. 5 mill.; lat. 3 mill.

Waigeo (Bernstein).

Caput utrinque post oculum late et profunde excavatum,

vertice valde tumido, fortiter substrigose punctato, antice bilobato, epistomate laevi. Prothorax subconicus, subtiliter remote punctulatus. Elytra basi thorace multo latiora, posse attenuata, regulariter lineatim punctata, punctis infra humeros et ad latera majoribus, callo humerali ipso tumido, laevi. Femora subtus dente valido acuto armata.

Rhembastus flavidus, spec. nov.

Suboblongo-ovatus, modice convexus, laete flavus, nitidus, capite rufescente, antennarum articulis quinque ultimis fuscis.

Long. 3— $3\frac{1}{3}$ mill.; lat. $1\frac{3}{4}$ —2 mill.

Afrique tropicale occidentale: Humpata (v. d. Kellen).

Caput sat dense undique punctatus, in media fronte obsolete impressus. Prothorax transversus, lateribus leviter rotundatus, parum dense subaciculatim punctatus, utrinque juxta marginem lateralem spatio laevi instructus. Scutellum laevissimum. Elytra regulariter lineatim punctulatis, punctis versus apicem minoribus. Femora subtus vix perspicue denticulata.

Cleorina fulvipes, spec. nov.

Ovata, convexa, subtus niger, pectore aeneo-tincto, supra viridi-anea, nitida, labro, palpis, antennis pedibusque fulvis.

Long. 3 mill.; lat. 2 mill.

Celebes: Gorontalo (v. Rosenberg).

Caput remote punctatum, epistomate antice sat fortiter angulatim emarginato. Prothorax dorso subremote, ad latera crebrius et subconfluenter, grosse punctatus, lateribus subarcuatus, juxta marginem anticum spatio laevi et sulco profundo transversim instructus. Elytra infra humeros late subarcuatim impressa, spatio inter callum humeralem et scutellum tumido, regulariter substriato-punctata, punctis ad latera et intra impressionem basalem majoribus, callo humerali ipso valde tumido, laevi.

Corynodes Schwaneri, spec. nov.

Brevis, oratus, valde convexus, subtus cyaneus, subviolaceo-reflexo-tinctus, supra metallico-viridis, aurato-reflexo-micans, nitidus, epistomate fronte separato, antennarum clava quinque articulata, prothorace grosse subremote punctato, elytris fortiter et regulariter lineatim punctatis, pedibus cyaneis, tarsis viridi-aeneis, unguiculis appendiculatis.

Long. 7—8 mill.; lat. 4—4 $\frac{1}{2}$ mill.

♂ *Femoribus intermediis subtus dente subacuto armatis; tibiis ejusdem paris extus paulo ante medium sinuatis, dein usque ad apicem ampliatis.*

♀ *Pedibus intermediis simplicibus.*

Borneo (Schwaner).

Caput inter oculos profunde transversim impressum, vertice tumido, fortiter subremote punctato, sulco longitudinali subtiliter instructo, frontis margine antico trilobato, lobis lateralibus obtusis, lobo intermedio subtriangulari, leviter producto, sulcis orbitalibus latis, profundis, laevibus; epistomate subtilissime alutaceo, punctulato, antice subrecte truncato; labro piceo; mandibulis nigris; palpis basi fulvis, apice piceis. Antennae satis elongatae, articulo 1°. inflato, metallico-viridi, articulis 2—6 aeneis, quinque ultimis modice dilatatis compressisque, nigro-cyaneis. Prothorax non semel latior quam longior, convexus, lateraliter valde deflexus, antice post oculos utrinque sinuatus, lateralibus modice rotundatis, a basi ad apicem convergentibus, dorso grosse subremote punctatus, interstitiis praesertim ad latera (oculo armato) minutissime punctulatis. Elytra brevia, valde convexa, ultra medium subito deflexa, infra humeros late transversim impressa, fortiter et regulariter lineatim punctata, punctis intra impressionem basalem majoribus, interspatiis alternis subelevatis, laevibus, ad latera et versus apicem costulatis. Pedes robusti, breves, femoribus fortiter punctatis, tibiis carinatis, subtus profunde canaliculatis, apice summo pilis fulvis instructis.

Colaspoides venusta, spec. nov.

Suboblongo-orata, convexa, viridi-metallica, aurato-micans, nitida, labro, palpis antennisque fulvis, hic apice piceo-infuscatis, femoribus viridi-metallicis, antice subtus medio angulatis, intermediis muticis; posticis subtus dente valido et acuto armatis, tibiis tarsisque brunneo-testaceis.

Long. 7—8 mill.; lat. $3\frac{1}{2}$ —4 mill.

Var. β . *Capite inter oculos, prothorace antice elytrisque omnino violaceo-roseis, fulgidis.*

Sumatra: Solok (Expéd. Scient. Néerl.); la variété de Serdang (Hagen).

Caput vix perspicue valde remote punctulatum, inter oculos vase impressum. Prothorax transversus, lèvis, punctis nonnullis hic illie irregulariter digestis instructus. Scutellum lèvissimum. Elytra infra humeros obsolete transversim impressa, subgeminatim punctata, punctis ad latera et intra impressionem basalem majoribus, interstitiis versus apicem subelevato-costulatis.

Colaspoides ciliatus, spec. nov.

Oblonga, modice convexa, subtus cum pedibus brunneo-testacea, pectore aeneo-tincto, supra subbrunneo-aenescens, nitida, labro brunneo-testaceo, palpis antennisque pallide fulvis, harum articulis duabus ultimis fuscis, femoribus antice subtus medio minutissime denticulatis, intermediis muticis, duobus posticis elongatis, fuciformibus, ultra medium ampliatis ibique dente valido acuto armatis, margine ipso pilis fulvis dense et longe ciliato.

Long. 6 mill.; lat. $3\frac{1}{4}$ mill.

Insula Engano prope Sumatra (Wienecke).

Caput inter oculos transversim impressum, juxta antennarum insertionem spatio lèvi tumido oblique instructum, remote subtiliter punctatum. Prothorax remote subtiliter aciculatim punctatum. Elytra seriatim subgeminato-punctata, interstitiis ad latera et versus apicem subcostata.